



Grandes
Cultures

Avertissements[®] Agricoles auvergne

Bulletin technique N° 5 du 19/05/94
Supplément n° 1

BLE
Maladies : Intervenir rapidement.
POIS
Maladies: Premier traitement fongicide.
TOURNESOL
Pucerons: A surveiller.
BETTERAVES
Pucerons : Rappel.

BLE

(Gonflement - 10
Stades)
(Epiaison - 10-1 à 10-4

MALADIES

✪ Situation

La "pression" maladies du feuillage s'intensifie.

- ROUILLE JAUNE : Détection de quelques foyers localement importants en Limagne (JOZE, SURAT...)
- ROUILLE BRUNE : Progression modérée, mais maladie très fréquente avec observations de pustules isolées sur les feuilles supérieures.
- SEPTORIOSE : En extension très nette, particulièrement dans l'ALLIER (Sologne et Bocage) avec "montée" sur les F3. Les pluies orageuses sont très favorables.
- OIDIUM : Pression localement modérée.

✪ Préconisation

ATTENTION à la Rouille jaune. Visiter correctement vos parcelles.
Les variétés réputées sensibles à la Rouille jaune comme Thésée, Récital, Sidéral méritent une grande vigilance. En cas de découverte de symptômes, agir en urgence avec un fongicide efficace (Triazoles). Consulter le dépliant SPV-ITCF (Couleur vert foncé).

Pour les autres maladies comme Septoriose et Rouille brune le traitement "épiaison" s'impose rapidement dans la majorité des situations. Appliquer un fongicide adapté à sa dose homologuée.

IMPORTANT : Ne pas ajouter d'insecticide à la bouillie.

Publication mensuelle
Abonnement annuel : 230 Frs
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
de la Protection des Végétaux
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
Tél : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70

P115

POIS

La floraison débute.

MALADIES

★ Situation

- Présence d'Anthracnose (*Ascochyta pisi*) sur la base des plantes dans beaucoup de parcelles.

★ Préconisation

Effectuer votre premier traitement dès le début floraison en visant d'abord le Botrytis, mais aussi l'Anthracnose. Choisir le fongicide adapté en consultant le dépliant jaune ITCF-SPV.

- ➔ Spécifiques "Botrytis" : Imides cycliques (Iprodione, Procymidone, Vinchlozoline).
- ➔ Triazoles : surtout efficaces sur Anthracnose.
- ➔ Contacts, comme le Chlorothalonil contrôlant bien l'Anthracnose.

N.B.: Ne plus employer de fongicides à base de BMC (Carbendazime...) du fait de la résistance du Botrytis.

La fiche couleur "Maladies du Pois" est à conserver pour vous aider à bien diagnostiquer les maladies.

PUCERONS

A surveiller.

Le seuil de 30 pucerons par plante est loin d'être atteint.

Ne pas ajouter d'insecticide au moment du premier traitement fongicide.

TOURNESOL

Stades 2 à 4 paires de feuilles

PUCERONS

★ Situation

En cultures, les populations observées atteignent localement 15 à 20 pucerons par plante (*Brachycaudus helichrysi*). Un début de crispation du feuillage est aussi noté.

★ Préconisation

A surveiller de très près dès maintenant et au cours de la semaine prochaine. Le seuil d'intervention pouvant être atteint localement.

- **SEUIL** : 30 à 50 pucerons par plante avant B5 puis 50 à 100 pucerons par plante de B5 à E1 (boutons étoilés).

- **PRODUITS HOMOLOGUES** : Pirimor, Enduro, Full M, Best, Karaté K, Mavrik Systo.


BETTERAVES

PUCERONS ET VIROSES

★ Situation

Les captures en bacs jaunes à LEMPDES (63) sont plus importantes.

PUCERONS DE LA BETTERAVE (LEMPDES)



En culture, la présence de pucerons est aussi signalée.

★ Préconisation

Maintenir une bonne couverture insecticide.

PM6